Acrothamnion butlerae (F.S. Collins) Kylin

phylum Rhodophyta › clase Florideophyceae › orden Ceramiales › familia Ceramiaceae

Descripción

Algas con porciones postradas y erectas, filamentosas, epifitas, de 0,5-1 cm de alto, color rosado, fijadas al sustrato mediante rizoides unicelulares. Ramificación opuesta y determinada. Ramas secundarias pinnadas, de crecimiento desigual, hasta 3 células de largo. Células axiales rectangulares, de 115-130 µm de ancho y de 200-350 µm de largo. Célula terminal de las pínulas transformada en una célula glandular conspicua, de 40-45 µm de ancho y 55-60 µm de largo.




Hábito



Ramificación principal



Detalle de las ramas de último orden, con células glandulares



Detalle de las células glandulares

Información Geográfica y Ecológica

Colectada para el proyecto en

• Gran Roque

- Coordenadas Geográficas: 11º 57' 16.4'' N, 66º 41' 32.1'' O • Coordenadas UTM: 751323 E, 1322578 N


Arrecife sumergido, 22,5 m de profundidad, corriente fuerte.

Referencias

Abbott, I.A. 1999. Marine red algae of the Hawaiian Islands. Honolulu, Hawaii: *Bishop Museum Press* 477 pp.

Proyecto Ficoflora Venezuela (c) G3C

Distribución geográfica



Proyecto Ficoflora Venezuela (c) G3C