Caulerpa microphysa (Weber-van Bosse) Feldmann

phylum Chlorophyta › clase Bryopsidophyceae › orden Bryopsidales › familia Caulerpaceae



Hábito



Detalle de las ramas determinadas

Descripción

Algas formadas por una porción estolonífera y una erecta de 1-2 cm de alto, color verde grama, fijadas al sustrato mediante rizoides. Porción erecta ramificándose irregularmente, con ramas determinadas creciendo en varios planos, esféricas, 1-2 mm de diámetro, agrupadas, con un corto estipe. Estructura interna constituida por filamentos cenocíticos, con trabéculas.

Información Geográfica y Ecológica

Colectada para el proyecto en

• Boca de Cote

- Coordenadas Geográficas: 11º 45' 57.6'' N, 66º 42' 03.9'' O • Coordenadas UTM: 750533 E, 1301703 N

Fondo arenoso con corales aislados y pradera de *Thalassia testudium*, hasta 1 m de profundidad, oleaje muy fuerte.

• Mosquitoquí

- Coordenadas Geográficas: 11º 52' 13.7'' N, 66º 51' 14.1'' O • Coordenadas UTM: 733783 E, 1313133 N


Fondo arenoso con corales blandos aislados, 13,4 m de profundidad, oleaje moderado.

Referencias

Dawes, C.J. 1974. Marine algae of the West coast of Florida. *University of Miami Press, Florida,* 201 pp.

Littler, D. S. & M. M. Littler. 2000. Caribbean reef plants. An identification guide to the reef plants of the Caribbean, Bahamas, Florida and Gulf of Mexico. *OffShore Graphics, Inc. Washington,* 542 pp.

Distribución geográfica



Proyecto Ficoflora Venezuela (c) G3C